

من ضمن منقول جنسيت



The publication was produced with the support
of the European AIDS Treatment Group under the CoPE project.

cope

continuous
patient
education

**EA
TG**

European
AIDS Treatment
Group

CHECKPOINT

Κέντρο πρόληψης και εξέτασης

الأمراض المنقولة جنسيا هي التهابات تسببها الكائنات الحية الدقيقة المختلفة ، ميزتها المشتركة هي أنها تنتقل مع الاتصال الجنسي

عدد الكائنات الدقيقة المعروفة اليوم كمنقولة بالجنس تتجاوز الثلاثين

في هذا الكتيب الصغير نقدم الالتهابات الرئيسية التي تسببها هذه الكائنات الحية الدقيقة المرضية
(البكتيريا – فيروس – الأوليات – فطريات و طفيليات)

المعلومات المنشورة هنا لا تهدف بأي حال من الأحوال إلي تقديم المشورة الشاملة أوالاتصال الشخصي البديل مع الطبيب المتخصص

الالتهابات التي تسببها البكتيريا مرض الزهري

سريعا!

- مرض الزهري ناتج عن بكتريا (تريبونيميا باليدوم) التي قد تكون في مرحلة كامنة لفترات طويلة
- ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو من الأم إلى الجنين عن طريق المشيمة
- يبدأ بجرح صغير على الأعضاء التناسلية والأمعاء والمستقيم أو الفم ويتطور في مراحل مختلفة
- في المرحلة الاولى يمكن أن تتم معالجته عن طريق حقن البنسلين
- إذا لم يتم علاجه يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة في القلب أو العينين أو الدماغ أو في الأعضاء الأخرى، مهددا بذلك حياة المرضى

كيف يمكن أن ينتقل؟

- ينتقل مع الجنس الشرجي أو المهبلي أو عن طريق الفم
- أيضا, يمكن أن ينتقل عندما نتلامس مع الجروح تما تسببها في جسم شخص آخر
- البكتيريا يمكن أن يخترق الجلد السليم الذي به خدوش صغيرة

ما هي الأعراض؟

- الزهري في المرحلة الأولى: العلامة الأولية هي جروح صغيرة واحدة أو أكثر بدون ألم، والتي تصل إلى أربعة أسابيع من لحظة انتقال العدوى

- **الزهري في المرحلة الثانية:** يحدث في غضون أسابيع قليلة من التئام الجروح الأولية ، مع وجود طفح جلدي في الوسط الجسم ثم في جميع أنحاء الجسم
- **الزهرة في المرحلة الكامنة:** في هذه المرحلة التي يمكن أن تستمر لسنوات عديدة ، لا توجد أعراض
- **الزهري في المرحلة الثالثة:** يمكن أن يؤثر المرض الآن على الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي

كيف يتم علاجها؟

- يمكن علاجه بالكامل إذا تم التشخيص في وقت مبكر
- العلاج عادة يتم باستخدام حقن البنسلين
- بعد عدة ساعات من العلاج ، قد يصاب الفرد بحساسية تجاه السموم الناتجة عن البكتيريا المدمرة ، مع ظهور أعراض مثل قشعريرة ، حمى ، تعب ، ألم عضلي ، غثيان وصداع
- ينصح بالامتناع عن ممارسة الجنس حتى يتم الانتهاء من علاج المريض وشريكه

الالتهابات التي تسببها البكتيريا مرض السيلان

سريعا!

- المرض السيلان هو عدوى تسببها بكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، وهي المكورة البنية
- يصيب عادة مجرى البول أو عنق الرحم أو الرحم أو المستقيم أو الحلق
- ينتقل عن طريق الجنس ، لكنه ممكن أن ينتقل أيضًا من الأم إلى الطفل أثناء الولادة

- التغيير المتكرر للشركاء في الجنس وعدم استخدام الواقي الذكري يزيد من خطر التعرض
- علاجها سهل وضروري نسبياً حتى لا تتسبب في أضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها

كيف يمكن أن ينتقل؟

- ينتقل مع الجنس الشرجي أو المهبلي أو عن طريق الفم
- البكتيريا يمكن أيضاً أن تنتقل عن طريق الأيدي التي تلامس القضيب المصاب أو المهبل أو فتحة الشرج
- تحدث الأعراض عادة بعد يومين إلى خمسة أيام من إصابة المريض
- ومع ذلك ، في الرجال قد تستغرق الأعراض ما يصل إلى شهر حتى تظهر
- كثير من الناس الذين يتعرضون للسيلان ليس لديهم أعراض

ما هي الأعراض؟

- ألم وخز في التبول
- ألم شديد في البطن عند النساء
- زيادة الميل أو الحاجة إلى التبول
- إفرازات مجرى البول من مجرى البول (أبيض ، أصفر أو أخضر)
- تهيج أو احمرار في فتحة مجرى البول
- حساسية أو تورم في الخصيتين
- التهاب الحلق (التهاب البلعوم السيلاني)

كيف يتم علاجها؟

- دكتورك يجب أن يفحص الأعراض و من المحتمل أن يحيلك لفحص المختبري و زراعة الإفرازات
- العلاج فعال جدا ويشمل المضادات الحيوية
- بعد أسبوعين من الانتهاء من العلاج ، يُنصح بإعادة الفحص نظرًا لوجود احتمال لمقاومة بعض المضادات الحيوية ، وبالتالي سوف تحتاج إلى تعديل علاجك
- يُنصح بإبلاغ شركاء الجنس في الثلاث أشهر السابقة للمرضى دون أعراض والأسبوعين السابقين للمرضى الذين يعانون من الأعراض ، وكذلك الامتناع عن ممارسة الجنس حتى يتم الانتهاء من العلاج

الالتهابات التي تسببها البكتيريا الكلاميديا

سريعاً!

- الكلاميديا مرض شائع ينتقل بالاتصال الجنسي
- وعادة ما تحدث في الشباب ، مع الحياة الجنسية المكثفة وتغيير شركاء الجنس
- يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي
- يمكن أن تنتشر أيضاً من خلال الأيدي عندما تتلامس مع الأعضاء التناسلية
- كثير من الناس الذين لديهم الكلاميديا قد لا تظهر عليهم أعراض
- العلاج بسيط نسبياً ، ولكن إذا ترك بدون علاج فقد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة

كيف يمكن أن ينتقل؟

- ينتقل مع الجنس الشرجي أو المهبطي أو عن طريق الفم
- باستخدام الواقي الذكري يمكن أن تقلل من خطر انتقال العدوى
- كما يمكن للأُم المصابة بالكلاميديا أن تنقل المرض للطفل أثناء الولادة

ما هي الأعراض؟

- إفراز السائل من القضيب أو المهبل
- ألم أو حرقان في البول
- دم من المهبل وآلام في البطن والغثيان والحمى
- ألم أثناء ممارسة الجنس عند النساء
- تهيج المستقيم
- تهيج عنق الرحم
- تورم وآلم في الخصيتين

كيف يتم علاجها؟

- الكلاميديا يمكن علاج ومعالجتها بالمضادات الحيوية
- إذا استمر ظهور الأعراض بعد العلاج ، فتحدث إلى دكتورك
- يُنصح بإجراء الاختبار مرة أخرى بعد حوالي ثلاثة أشهر من إكمال العلاج
- يُنصح بإبلاغ شركاء الجنس في الست الأشهر السابقة للمرضى دون الأعراض والأسابيع الأربعة السابقة للمرضى الذين يعانون من الأعراض ، وكذلك الامتناع عن ممارسة الجنس لمدة أسبوع بعد اكتمال العلاج

لالتهابات التي تسببها البكتيريا مرض الشيجلا (في الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال)

سريعا!

- مرض الشيجلا سبب البكتيريا، كان يطلق عليه اسم إسهال البكتيريا
- البكتيريا الشيجلا تنتقل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الجهاز الهضمي و طريق الفم من المرضى أو من المرضى بدون أعراض
- يتم تشخيص المرض في المختبر عن طريق عزل البكتيريا في البراز
- تلاحظ الأوبئة في ظروف متزامنة وحيث لا تُحترم قواعد النظافة الشخصية ، كما هو الحال في السجون ومخيمات اللاجئين. كما لوحظت الأوبئة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال

كيف يمكن أن ينتقل؟

- ينتقل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من خلال الجنس عن طريق الفم والشرج
- قد تنتقل أيضًا بسبب عدم الامتثال لقواعد النظافة
- يمكن البكتيريا التي تسبب مرض الشيجلا البقاء على قيد الحياة في البيئة لمدة تصل إلى عشرين يوما ، لهذا السبب يمكن نقله عبر أي أنبوب ملوث بالبراز (المناشف ، المراحيض ، إلخ)

ما هي الأعراض؟

- الإسهال يرافقه الحمى
- الغثيان وأحيانا تسمم الدم (وجود كميات كبيرة من السموم البكتيرية في الدم)
- القيء والتقلصات الشديدة في البطن
- الدم والمخاط في البراز

كيف يتم علاجها؟

- السوائل مهمة في حالات الإسهال والجفاف
- إدارة المضادات الحيوية يقلل من مدة وشدة المرض
- على مدى العقود الماضية ، البكتيريا التي تسبب مرض الشيكل أظهرت الزائد لتطويع مقاومة للمضادات الحيوية الجديدة

الالتهابات البكتيرية الأخرى والتي يحتمل أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي هي التهاب الإحليل غير السيلاني ، التهاب المهبل ، الورم الحبيبي ، التهاب الأمعاء والتهاب البروستاتا لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال

الالتهابات التي تسببها الفيروسات فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

سريعا!

- فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يهاجم الجهاز المناعي ، أي دفاع الجسم ضد العدوى
- يتجلى مرض الإيدز في المرحلة الأخيرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، حيث يضعف الجهاز المناعي إلى حد يجعله عرضة لمختلف الأمراض وأنواع السرطان
- يوجد الفيروس ويمكن أن ينتقل عن طريق الدم والسائل المنوي والسوائل عن طريق الجلد ومخاط المستقيم والسوائل المهبلية
- الفحص المنتظم ، العلاج كوقاية (TasP) ، الوقاية قبل التعرض (PrEP) ، الوقاية بعد التعرض (PEP) واستخدام الواقي الذكري هي تدابير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)
- التشخيص والعلاج المبكر يقلل من تأثير الفيروس على الجسم ويجعل المرض مزمن وغير فتاك
- الشخص الذي يتلقى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ويحقق مستويات غير قابلة للكشف من الفيروس في دمه لمدة ستة أشهر على الأقل ، لا يستطيع عمليا نقل الفيروس إلى شركائه الجنسيين

كيف يمكن أن ينتقل؟

- مع الجنس دون استخدام الواقي الذكري
- باستخدام الوسائل الشائعة في استخدام المواد ذات التأثير النفسي
- من الأم الحامل المصابة إلى الجنين ، على الرغم من أن هذه الإمكانية أصبحت الآن إلى الحد الأدنى بفضل العلاج المضاد للفيروسات العكوسة

- نقل الدم المصاب ، على الرغم من أن هذا الخطر قد تم القضاء عليه الآن بسبب الفحص المختبري الشامل لزجاجات الدم
- باستخدام إبرة غير معقمة للوشم أو لثقبات الحلق
- لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الاتصال الاجتماعي وعن طريق سوائل الجسم مثل العرق أو اللعاب أو الدموع أو البول

ما هي الأعراض؟

- المرحلة الأولى تسمى العدوى الحادة وعادة ما تبدأ في غضون أسبوعين إلى ستة أسابيع بعد التعرض ، قد يكون له أعراض الأنفلونزا أو لا توجد أعراض على الإطلاق
- في المرحلة الثانية يمكن أن تستمر لسنوات عديدة حيث تهدأ الأعراض ، يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية تدريجياً خلايا الليمفاوية CD4 T ويدمر الجهاز المناعي
- في المرحلة الثالثة ، انخفض عدد الخلايا CD4 إلى أقل من مائتي جهاز المناعة لم يعد قادراً على مواجهة العديد من الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة

كيف يتم علاجها؟

- يتم إعطاء العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية ، الذي يقمع التنشغيل الفيروسي في الدم ولكنه لا يزيله
- لهذا السبب ، فإن الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقون لعلاج مدى الحياة
- يشمل العلاج أيضاً المتابعة الدورية والفحوص المختبرية للتأكد من نجاح العلاج المضاد للفيروسات العكوسة

الالتهابات التي تسببها الفيروسات التهاب الكبد B (HBV)

سريعاً!

- التهاب الكبد B هو سبب فيروس HBV
- قد يكون من المعتدل أن يستمر لبضعة أيام (حادّة) أو طويلة ، مما قد يؤدي إلى أمراض الكبد وتليف الكبد وسرطان الكبد وحتى الموت
- يتميز بأنه تهديد صامت لأنه في كثير من الأحيان لا يوجد لديه أعراض
- ينتقل عندما يدخل الدم المصاب من الفيروس أو السائل المنوي أو السائل المهبلي إلى جسم الشخص
- يمكن أن يعيش الفيروس خارج جسم الإنسان لمدة سبعة أيام على الأقل
- أفضل طريقة لحماية الشخص من فيروس التهاب الكبد B هي التلقيح

كيف يمكن أن ينتقل؟

- من خلال الجماع الجنسي
- باستخدام الوسائل الشائعة في استخدام المخدرات عن طريق الوريد
- من الأم الحامل المصابة إلى الطفل أثناء الولادة
- عند العمل للوشم أو تقب
- نقل الدم المصاب ، على الرغم من أن هذا الخطر قد تم القضاء عليه الآن بسبب الفحص المعملّي الشامل لزجاجات الدم

ما هي الأعراض؟

- يمكن أن يحدث التهاب الكبد الحاد مع أعراض محدودة أو معدومة، الأساسيات هي اليرقان ، وهذا هو اصفرار الجلد والعينين والبول الداكن والتعب والغثيان والقيء وآلام البطن والحمى وانخفاض الشهية وآلام العضلات أو المفاصل
- في التهاب الكبد المزمن B يبقى معظم الناس دون أعراض لمدة عشرين إلى ثلاثين سنة

كيف يتم علاجها؟

- التهاب الكبد B الحاد يتكرر دون علاج
- يعالج التهاب الكبد المزمن B بالأدوية المزمنة التي تسبب معاناة في نسبة كبيرة من المرضى
- يُنصح باستخدام اللقاح لجميع الرضع والأطفال والمراهقين وكذلك البالغين الذين يتعرضون لخطر متزايد من التعرض للفيروس
- بعد التطعيم ، يوصى بإعادة فحص المضادة كل خمس سنوات

الالتهابات التي تسببها الفيروسات التهاب الكبد C (HCV)

سريعاً!

- التهاب الكبد C هو التهاب في الكبد بسبب الفيروس HCV
- ينتقل عن طريق الدم ، وليس من خلال الاتصال الاجتماعي
- معظم الناس الذين يعيشون مع التهاب الكبد C لا تظهر عليهم أعراض المرض ومسار المرض خفيف
- تشير التقديرات إلى أن حوالي ٢ ٪ من السكان في اليونان يعانون من التهاب الكبد المزمن C ، لكنه لم يتم فحصه ولا يعرف ذلك
- انخفضت الحوادث الجديدة بشكل كبير منذ عام ١٩٩٢ بسبب الفحص المختبري الإلزامي للدم ومشتقاته
- المجموعة الأكثر ضعفا هي المستخدمين المخدرات عن طريق الوريد ، بسبب استخدام المشترك وسائل الشائعة
- في السنوات الأخيرة ، تم توثيق ثورة الشفاء في التهاب الكبد C ، جيل جديد من الأدوية التي تغير جذرياً علاج المرض وتزيل الفيروس أكثر من ٩٥ ٪

كيف يمكن أن ينتقل؟

- باستخدام الوسائل الشائعة في استخدام المخدرات عن طريق الوريد
- من خلال الجماع الجنسي
- نقل الدم المصاب أو مشتقاته (١٩٩٢)
- زرع الأعضاء المصابة في الماضي
- الأعمال الطبية أو شبه الطبية (الحقن ، الوشم ، ثقب الجسم)
- انتقال عمودي من الأم إلى الطفل

ما هي الأعراض؟

- غالبية المصابين بالتهاب الكبد الحاد C ليس لديهم أعراض
- ومع ذلك ، لا ينجح معظمهم في القضاء على الفيروس ومن ثم يصابون بالتهاب الكبد المزمن C
- التهاب الكبد المزمن C يؤدي عادة إلى تليف الكبد في غضون عشرين سنة
- في وقت واحد وجود التهاب الكبد B أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وتعاطي الكحول تسريع تطور المرض

كيف يتم علاجها؟

- في التهاب الكبد الحاد C ينصح العلاج الأكثر في الوقت المناسب من أجل تجنب انتقاله إلى الشكل المزمن
- إذا وجدت نفسك إيجابيًا في التهاب الكبد C ما عليك القيام به سلسلة من الفحوص المختبرية لمعرفة حالتك الصحية ، مرحلة المرض والكبد الخاص بك
- يوجد حاليًا نوعان من الأدوية المتاحة في اليونان ، هذه هي دواء ضد فيروسات العمل المباشر (DAA's) التي تتوفر من عام ٢٠١٤ والعلاجات القديمة (انترفيرون و ريبافيرين)
- تستند العلاجات الجديدة على مجموعة من الأدوية بالنمط الجيني التهاب الكبد C كمعيار رئيسي ، لديها القليل من أي آثار جانبية وتختلف مدتها من ثمانية إلى أربعة وعشرين أسبوعًا

الالتهابات التي تسببها الفيروسات التهاب الكبد A (HAV)

سريعاً!

- التهاب الكبد A هو سبب فيروس HAV
- وعادة ما ينتقل عن طريق الأغذية أو المياه الملوثة
- ويمكن أيضاً أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ونادراً ما عن طريق الدم
- عادة ما يكون المرض خفيف ومحدود في حد ذاته ، في كثير من الحالات لا يوجد لديه أعراض سريرية
- لا يوجد شكل مزمن للمرض ، شخص مصاب بالتهاب الكبد (A) لا يمكن أن يصاب مرة أخرى
- يوجد لقاح ضد التهاب الكبد A الذي يحميه منذ حوالي عشر سنوات

كيف يمكن أن ينتقل؟

- عن طريق تناول الطعام أو الماء الذي تلامس براز الشخص المصاب بالتهاب الكبد A ، على سبيل المثال ، عندما لا يغسل الشخص أيديهم جيداً بعد استخدام المرحاض ثم يلمس الطعام أو السطوح أو الفم شخص آخر

ما هي الأعراض؟

- اليرقان: يسبب صبغة صفراء على الجلد والعينين والبول أصفر عميق والبراز تصبح أكثر عديم اللون

- التعب وآلام العضلات

- آلام في البطن وخاصة في الكبد

- فقدان الشهية

- الحمى

- الإسهال

- الغثيان والقيء

- تضخم الكبد

كيف يتم علاجها؟

- لا يوجد علاج محدد لالتهاب الكبد A

- ومع ذلك ، إذا كنت تشك في أنك تعرضت للفيروس ، فيجب عليك استشارة دكتورك ، يوجد مصل خاص (غاما الجلوبيولين) يحميه إذا تم في الوقت المناسب ، أي ما يصل إلى أسبوع واحد بعد انتقاله

- يمكن أيضًا تناول الأدوية لعلاج الأعراض

- التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من التهاب الكبد A ، يوصى به لمجموعات مثل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ومتعاطي المخدرات عن طريق الوريد والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الأشخاص الهيموفيليك والأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد المزمن

الالتهابات التي تسببها الفيروسات فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

سريعاً!

- ينتقل الفيروس HPV بشكل رئيسي من خلال الجنس الشرجي أو المهبلي أو الفموي
- هناك أكثر من مائة وخمسين نوعاً مختلفاً منه
- يمكن أن تسبب العديد من هذه الفيروسات الثآليل وبعض أنواع السرطان الأخرى
- الواقي الذكري لا يضمن الحماية المطلقة ضد انتقال الفيروس
- هناك لقاح يحمي ضد غالبية أنواع الفيروسات التي تسبب الثآليل والسرطان

كيف يمكن أن ينتقل؟

- عن طريق الاتصال المباشر مع جلد الأعضاء التناسلية والأغشية المخاطية أو سوائل الجسم أثناء ممارسة الجنس
- الواقي الذكري لا يحمي من العدوى لأنه لا يغطي بالكامل مناطق الجلد المصابة بالفيروس
- يمكن أن ينتقل الفيروس حتى لو لم يصاب الشخص المصاب بأعراض كما الثآليل

ما هي الأعراض؟

- سيتعرض معظم الناس للفيروس في مرحلة ما من حياتهم ، ولكن المرض سوف يتطور بنسبة صغيرة
- تظهر الثآليل التناسلية عادة كجرح صغير أو مجموعة من الكتل في منطقة الأعضاء التناسلية أو الفم أو فتحة الشرج
- الثآليل قد تختلف في الحجم ويمكن أن تنفث أو مسطحة
- يمكن أن تسبب بعض أنواع الفيروسات السرطان في مختلف الأعضاء ، مثل عنق الرحم والفرج والمهبل والقضيب والشرج و بلعوم الفموي

كيف يتم علاجها؟

- حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس الورم الحليمي البشري ، باستثناء الأعراض التي يسببها
- الثآليل التناسلية تتطلب عادة تدخل طبي ، على الرغم من أن ليست الأوقات نادرة التي تختفي من تلقاء نفسها
- سيقرر دكتور الطريقة المناسبة للإزالة: مع الأدوية الخاصة للتطبيق المحلي ، مع الكي ، مع العلاج بالتبريد ، مع الاستئصال الجراحي
- التطعيم هو أهم درع للوقاية من الفيروس
- التطعيم مجاني في اليونان للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من سن الثامنة عشرة إلى السادسة والعشرين والفتيات حتى الثامنة عشرة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية حتى سن السادسة والعشرين

الالتهابات التي تسببها الفيروسات هربس الأعضاء التناسلية

سريعا!

- هربس الأعضاء التناسلية هو مرض فيروسي يصيب الجلد على القضيب وجذع القضيب والمهبل
- يمكن أن يحدث أيضًا في فتحة الشرج والأرداف والفم والحلق
- معظم الناس الذين يعانون من الهربس الأعضاء التناسلية لا يعرفون ذلك ، حيث لا توجد أعراض في كثير من الأحيان
- لا يوجد علاج لهذا المرض ، ولكن هناك لأعراضه
- استخدام الواقي الذكري يمكن أن يقلل ، ولكن لا يلغي خطر التعرض

كيف يمكن أن ينتقل؟

- ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي
- كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الجرح أو حتى الأشياء أو الملابس الملوثة ، حيث يبقى الفيروس ليضع ساعات
- يمكن أيضا اكتشاف الفيروس حتى على الشفاه
- الفيروس لديه خاصية أنه يمكن أن تكون مخفية في شكل كامن في الأعصاب و يستيقظ عندما يضعف دفاع الجسم عن طريق العدوى أو الإجهاد أو أثناء الحيض

ما هي الأعراض؟

- عادة في غضون ثلاثة إلى تسعة أيام بعد الإصابة هناك احمرار وبقع صغيرة مع السائل في المنطقة المصابة
- وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالألم وإحساس حارق
- فقاعات تتكسر وتخلق قشرة وتتحول إلى جروح صغيرة الذي تشفى من تلقاء نفسها خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

كيف يتم علاجها؟

- لا يوجد علاج لاستئصال الفيروس
- ومع ذلك ، يمكن للأدوية المضادة للفيروسات تخفيف الألم وتضميد الجروح بسرعة نسبية
- هذه الأدوية فعالة بشكل رئيسي في المظاهر الأولى من الهربس وأقل مرة في المرة القادمة التي يظهر فيها الفيروس الأعراض مرة أخرى
- في أي حال ، عندما ترى الأعراض الأولى ، يجب عليك استشارة طبيبك حول العلاج الواجب اتباعه

الالتهابات الفيروسية الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي هي كما يلي: عدد كريات الدم البيضاء المعدية ، عدوى الفيروس المضخم للخلايا (CMV) ، الأعضاء التناسلية المعدية وساركوما كابوسي

الالتهابات التي تسببها الاوليات و الطفيليات مرض داء المشعرات

سريعا!

- داء المشعرات هو كائن أولي الذي يصيب الرجال والنساء
 - في النساء ، توجد الجراثيم بشكل رئيسي في عنق الرحم ، مجرى البول والمثانة
 - في الرجال ، وجدت أساسا في مجرى البول وغدة البروستاتا
 - ينتقل بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي
 - تشمل الوقاية استخدام الواقي الذكري وتجنب مشاركة العناصر مثل المناشف والملابس والملابس الداخلية
 - تشمل الأعراض عند وجودها عادة إفرازات وحكة
 - العلاج سهل ويتضمن دواءً عن طريق الفم
- كيف يمكن أن ينتقل؟
- من خلال الجماع الجنسي
 - ويمكن أيضا أن تنتقل عن طريق المناشف والملابس الداخلية وغيرها من المواد في ظروف رطبة
- ما هي الأعراض؟
- إفرازات من القضيب أو المهبل
 - رائحة كريهة
 - الحكة أو الألم عند التبول
 - ألم خلال فترة الحيض للنساء

كيف يتم علاجها؟

- العلاج ينطوي على دواء ويتطلب الامتناع عن تعاطي الكحول الشديد أثناء العلاج بسبب الآثار الجانبية
- ومع ذلك ، فإنه لا يحمي من انتقال الطفيليات الجديدة والعدوى الجديدة

الالتهابات التي تسببها الأوليات و الطفيليات مرض الجرب

سريعاً!

- مرض الجرب ناجم عن طفيلي صغير يخترق الجلد لوضع بيضه
- ينتقل عن طريق الاتصال الجسدي الحميم وليس فقط الاتصال الجنسي
- يتم التعامل مع المراهم الصيدلانية الخاصة
- أعراضه هي حكة شديدة خلال الليل والطفح الجلدي على الجل

كيف يمكن أن ينتقل؟

- يمكن أن ينتقل أثناء جماع الجنسي
- ومع ذلك فإنه ينتقل بطرق أخرى ، مثل شخصين يتقاسمان نفس السرير أو المنشفة
- كلما كان هذا الاتصال أقرب وأطول ، زادت فرصة انتقال العدوى

ما هي الأعراض؟

- بسبب الحكّة الشديدة والطفح الجلدي بسبب رد فعل الجلد للقضاء على الطفيلي
- يمنع مناطق البشرة الرفيعة وعديمة الشعر ويتجنب المناطق ذات الكثافة العالية للشعر
- مرض الجرب في الأشخاص الذين ينتقلون عن طريق الاتصال الجنسي ، غالبًا ما توجد في منطقة الأعضاء التناسلية أو البطن أو الفخذين
- في حالات أخرى ، توجد في المناطق الجانبية لليدين والرسغين و الزر البطن وحول الإبطين والمرفقين والوسط الجسم

كيف يتم علاجها؟

- علاج مرض الجرب بسيط ، لكنه يحتاج إلى تخطيط
- يجب أن تبدأ مباشرة بعد التشخيص الأولي من أجل منع انتشار الطفيليات
- يحتوي على لف الجسم بالكامل مع كريم خاص ضد مرض الجرب
- يجب عليك استشارة طبيبك لاتخاذ قرار بشأن العلاج الأنسب
- معكم ، من المستحسن الخضوع للعلاج ، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون معًا في المنزل وشركاءك المحبين في الماضي

الالتهابات التي تسببها الاوليات و الطفيليات قمل الأعضاء التناسلية

سريعاً!

- هذه هي الحشرات الطفيلية الصغيرة التي تعيش وتتكاثر في الشعر
- تنتشر من خلال جميع أنواع الجماع الجنسي وتكون مرئية للعين
- بالإضافة إلى الأعضاء التناسلية ، فإنها يمكن أن تنتشر إلى المناطق المشعرة من القدمين والبطن والصدر والإبط واليدين
- يبدو كأنه سلطعون صغير بني اللون ، يتراوح حجمه بين ١,٥ و ٢ مم ، ويتشبث بالبشرة بقوة كبيرة
- لا تشكل خطراً على الصحة ، ولكنها تسبب الحكة والتهيج

كيف يمكن أن ينتقل؟

- تنتقل عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق وعادة عن طريق الجن
- الأغشية الملوثة هي أيضا مصدر انتقال

ما هي الأعراض؟

- أنها تسبب الحكة بسبب اللعاب الذي تفرزه
- عندما ينفصلون عن الجلد ، يبدؤون ويمشون ويتفهم المرء أنه طفيل
- بيضها المكتشفة الذي هو أبيض اللون يوجد بالقرب من جذور الشعر أيضا

كيف يتم علاجها؟

- العلاج مشابه لعلاج قمل الرأس
- هناك العديد من الأدوية الفعالة التي تقتل القمل مع العلاج الموضعي
- بعد كل علاج ينصح بتغيير الملابس الداخلية والملابس
- يجب غسل الملابس والمناشف والفراش الذي استخدمته قبل العلاج بالماء الساخن والكي
- ينصح شريكك الجنسي أيضاً بالتماس العلاج

الإصابات الأخرى الناجمة عن الأوليات والطفيليات والفطريات هي المعاملة بالمثل لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الآخرين و التهاب رأس القضيب

الأكاذيب والحقائق

كاذب

مع تقدم الدواء لا يوجد سبب يدعو للقلق. يتم علاج الأمراض المنقولة جنسيا بالمضادات الحيوية

حقيقة

الحقيقة هي أن مرض الزهري والسيلان والتهاب الإحليل والتهاب المهبل يعالجون بالمضادات الحيوية المناسبة ، لهذا السبب ، يجب إجراء الفحوصات المختبرية عند الاشتباه في الأمراض المنقولة جنسياً ، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضاً أن العديد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي لا تسبب دائماً الأعراض ، خاصة عند النساء ، الفشل في العلاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة

كاذب

يظهر الرجل الذي يعاني من الأمراض المنقولة جنسيا من خلال سلوكه ، عليك فقط معرفة كيفية تقدير الناس

كاذب

الواقى الذكري حماية ضد جميع الأمراض المنقولة جنسيا

حقيقة

الأمراض المنقولة جنسيا لا تميز ، يمكن لأي شخص نشط جنسيا أن يصاب

حقيقة

على الرغم من أن الواقى الذكري لا يحمي بأمان من انتقال جميع الأمراض المنقولة جنسيا ، إلا أن استخدامه يظل خيار الحماية المناسب

كاذب

العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي لمرة واحدة تجعلك محصنا ، مما يعني أنه لا يمكنك إعادة الإصابة

كاذب

الأمراض المنقولة جنسيا تؤثر فقط على الأعضاء التناسلية

حقيقة

قد تتعرض لمرض ينتقل بالاتصال الجنسي أكثر من مرة ، إما عن طريق شريك غير معالج أو شريك جنسي جديد ، الكلاميديا المعالجة ، السيلان أو مرض الزهري لا يحمي المرضى من إعادة العدوى

حقيقة

تقريبا جميع الأمراض المنقولة جنسيا لها آثار في مناطق أخرى غير الأعضاء التناسلية ، في هذه الحالات نادرا ما يجمع المرضى الأعراض مع المرض مما يؤخر التشخيص والعلاج ، يمكن أن تحدث الأحداث في تجويف الفم والعينين والمفاصل وجهاز القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي

المصدر: مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في اليونان



www.mycheckpoint.gr

THESS CHECKPOINT

Εنوان: سيولو ١٥ ، فيسالونيكى

تليفون: ٢٣١٠٢٨٢٢٨٤

الإثنين: ١٦:٠٠ – ٢٠:٠٠

من اليوم الثالث إلى الجمعة: ١٢:٠٠ – ٢٠:٠٠

السبت: ١٢:٠٠ – ١٦:٠٠

info@thesscheckpoint.gr

ATH CHECKPOINT

Εنوان: بيتتاكى ٤ ، موناستيراكى ، أثينا

تليفون: ٢١٠٣٣١٠٤٠٠

من اليوم الثالث إلى السبت: ١٢:٠٠ – ٢٠:٠٠

info@athcheckpoint.gr

ATH CHECKPOINT

Πιπάκη 4, Μοναστηράκι, Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 400

Τρ. – Σαβ.: 12:00 – 20:00

info@athcheckpoint.gr

THESS CHECKPOINT

Αλ. Σβώλου 15, Θεσσαλονίκη

Τηλ : 2310 282 284

Δευ. : 16:00 – 20:00

Τρ. – Παρ.: 12:00 – 20:00

Σαβ. : 12:00 – 16:00

info@thesscheckpoint.gr

Σε συνεργασία:



Επιστημονική επιμέλεια:



Με την υποστήριξη:

