



Cimurro (CDV) Ag

Il cimurro infettivo canino è un morbillivirus appartenente alla famiglia Paramyxovirus. L'infezione avviene per contatto diretto con animali infetti. Il virus viene escreto attraverso diverse secrezioni e con le feci; può essere mezzo di contagio per parecchi giorni dopo l'escrezione. Il periodo d'incubazione della malattia varia da 3 a 6 giorni. Il virus rimane attivo solo per un periodo così breve a causa della radiazioni UV ed ai valori di pH del terreno. I sintomi generalmente colpiscono l'apparato respiratorio ed il tratto digestivo. La sintomatologia clinica del cimurro si manifesta tipicamente attraverso lo scolo nasale ed oculare, tosse, difficoltà respiratorie, vomito e diarrea. Nei casi più gravi si possono manifestare anche difficoltà motorie, convulsioni e dimagrimento.

Informazioni

Test immunocromatografico per la ricerca degli antigeni del *Canine Distemper Virus*


- Linea controllo e linea test: colore rosso
- Sensibilità: 98%
- Specificità: 99%
- Campione: tamponi congiuntivali, muco nasale, urine e siero di cane
- Prodotto in Germania

Il kit contiene


- Card
- Pipette
- Tamponi
- Diluente

Procedura d'esecuzione

Siero, plasma



Sangue intero



Interpretazione

Una linea in corrispondenza della C = negativo

Una linea in corrispondenza della C ed una della T = positivo

Nessuna linea o una linea solo sulla T = non valido

Confezioni:

- da 5 test codice 111442-05,
- da 10 test codice 111442-10,
- da 20 test codice 111442-20

