



## Borrelia (Lyme) Ab

La malattia è trasmessa da vettori (*Ixodes ricinus*) e la loro riserva naturale è negli animali allo stato brado. Una infezione non provoca una immediata malattia, prima di una sintomatologia clinica c'è un periodo di incubazione che varia da 2 a 5 mesi. La sintomatologia clinica è insidiosa in quanto non ha caratteristiche peculiari ma presenta sintomi non specifici quali apatia, linfadenopatia e febbri saltuarie. Come possibile manifestazione clinica è stata descritta una alterazione artrosica lamellare in diversi siti. E' difficile una sua completa eliminazione con una terapia antibiotica, è pertanto necessario riconoscere la malattia ai primi sintomi in modo da intervenire prontamente.

### Informazioni

Test immunocromatografico per la ricerca degli anticorpi di *Borrelia burgdoferi* (Lyme) antigene C6


- Linea controllo e linea test: colore rosso
- Sensibilità: 96%
- Specificità: 94%
- Campione: siero, plasma o sangue intero di cane
- Prodotto in Germania

### Il kit contiene


- Card
- Pipette
- Diluente

### Procedura d'esecuzione

#### Siero, plasma



#### Sangue intero




### Interpretazione

Una linea in corrispondenza della C = negativo

Una linea in corrispondenza della C ed una della T = positivo

Nessuna linea o una linea solo sulla T = non valido



Confezioni:

da 5 test codice 111442-05,

da 10 test codice 111442-10,

da 20 test codice 111442-20